



Engrais soluble NPK .Spécialement formulé pour fertirrigation.

Formulation : Engrais soluble 100% dans l'eau.

FERTI D'OR 28.14.14 est utilisable en fertigation pour des cultures plein champ et hors sol permettant le développement du système végétatif et assurant la récolte des cultures maraîchères et fruitières. Il est composé exclusivement d'éléments nutritifs assimilables qui sont dosés pour une absorption maximale par les plantes pendant les cycles végétatifs.

Composition : p/v

Azote total (N)	28%
Azote Uréique($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$)	21,1%
Azote Ammonical(NH_4)	2,8%
Azote Nitrique (NO_3)	4,1%
Anhydride Phosphorique (P_2O_5)	14%
Oxyde de potasse (K_2O)	14%

Oligo-éléments :

Fer (Fe)	0,039%
Cuivre(Cu)	0,0033%
Manganèse (Mn)	0,0163%
Zinc (Zn)	0,013%
Molybdène(Mo)	0,0017%
Bore (B)	0,0163%

pH=5 ,95

Période d'utilisation :

La formulation est recommandée pendant les périodes de forte croissance et une demande accrue d'azote par les cultures.

Doses et mode d'emploi :

En irrigation fertilisante :

Cultures maraîchères :

De 100 à 150 Kg /Ha/ semaine.

Arbres fruitiers :

De 100 à 150 Kg /Ha/ semaine.

En pulvérisation foliaire :

250 a 500g pour 100L d'eau.

NB : Ces doses peuvent varier selon le stade de la plante, le type du sol et qualité de l'eau d'irrigation.

Nous conseillons de faire une analyse du sol pour estimer les besoins.

Conseils d'utilisation :

- Traiter tôt le matin ou en fin de journée.
- Compatible avec la plus part d'autres engrais.
- Ne pas mélanger avec huiles et dérivés.
- Ne pas mélanger avec les herbicides.
- Ne pas mélanger avec des produits à forte réaction alcaline, ainsi qu'avec du soufre.



فارتي دور 28.14.14

سماد قابل للذوبان آزوت، فوسفور، بوتاسيوم مخصص للتسميد بالري.

الصيغة : سماد قابل للذوبان في الماء بنسبة 100 %.

فارتي دور 28.14.14 يمكن استخدامها في تسميد الزراعات في الحقول و خارج التربة مما يسمح بتطوير النظام النباتي وضمان جني الخضروات الفواكه. تتكون خصيصا من العناصر الغذائية المتوفرة والمناسبة للحصول على أقصى امتصاص من قبل النباتات خلال الدورات النباتية.

المكونات			العناصر الصغرى		
الآزوت الكلي (N)			الحديد (Fe)		
آزوت اليوريا $(CO(NH_2)_2)$			النحاس (Cu)		
آزوت امونياكال (NH_4)			المنغنيز (Mn)		
آزوت نتريك (NO_3)			الزنك (Zn)		
أنهيدريد فوسفوريك (P_2O_5)			الموليبدان (Mo)		
أكسيد البوتاسيوم (K_2O)			البور (B)		
درجة الحموضة = 5.95					

فترات الاستعمال :

التركيبية موصى بها في فترات النمو و عند الحاجة المتزايدة للآزوت من طرف المحاصيل الزراعية.

الجرعات و طريقة الاستعمال :

التسميد بالري :

الخضروات :

100 الى 150 كغ / هكتار / الأسبوع.

الأشجار المثمرة :

100 الى 150 كغ / هكتار / الأسبوع.

طبيب الورقي :

250 الى 500 غ / 100 لتر ماء.

ملاحظة : هذه الجرعات يمكن أن تتغير على حسب مراحل نمو النبات، نوعية التربة و كذا نوعية مياه السقي.

ننصح بالقيام بتحليل للتربة من أجل تحديد احتياجاتها.

نصائح الاستعمال :

- يستخدم في الصباح الباكر او في المساء.
- يتوافق مع جميع انواع الأسمدة الأخرى.
- لا يخلط مع الزيوت ومشتقاتها.
- لا يخلط مع مبيد الأعشاب الضارة.
- لا يخلط مع منتجات ذات رد فعل قوي قاعدي، وأيضا مع الكبريت.